

Ультракаин®

При рутинных процедурах у ASA 1–3 и особых групп пациентов, например, дети*, беременные женщины* и пожилые пациенты* старше 65 лет.

20 Min

Ультракаин® Д без адреналина

Преимущества субстанции и терапии

Глубокий эффект для стандартных операций с коротким временем анестезии^{2,3}
Более короткое время онемения по сравнению с Ультракаином®, содержащим адреналин
Также для использования у пациентов высокого риска³
Меньше побочных эффектов³, поскольку отсутствуют сосудосуживающие компоненты

Практический совет по проведению инфильтрационной анестезии

Всегда используйте все содержимое ампулы (1,7 мл) и начинайте лечение уже через 1 минуту.

Дозировка

Одна ампула (1,7 мл) на зуб или два смежных зуба.

Максимальная дозировка

4 мг на 1 кг массы тела
При концентрации 40 мг артикаина/мл это соответствует объему 7 мл (примерно 4 цилиндрические ампулы) для пациента весом 70 кг.

Лекарственная форма и размеры упаковки

Карпулы

объемом 1,7 мл
Без сульфитов, без парабенов
+ Упаковка из 10 цилиндрических ампул

Срок годности

3 года после изготовления

Хранение

не требует особых условий



РЕКОМЕНДАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ТИПА ПАЦИЕНТА⁴

Классификация пациентов по группам ASA³

Классификация в соответствии с «Физическим статусом по ASA» на основании системных заболеваний

ASA 1

Здоровые пациенты

ASA 2

Пациенты с легким общим заболеванием, например гипертонией или неинсулинозависимым сахарным диабетом

ASA 3

Пациенты с тяжелыми хроническими общими заболеваниями, такими как сердечная аритмия, цирроз печени и эмфизема

Особые группы пациентов

Дети/беременные женщины/старше 65 лет

Резекция верхушек корней жевательных зубов - Остеотомия
Цистэктомия - Вестибулопластика
Синус-лифтинг - Глубокий разрез
Множественные имплантаты (> 2)
Множественные препарирования (> 3)

Продолжительность процедуры до 75 мин.

Артикаин с адреналином 1:100.000



75 Min

Артикаин с адреналином 1:200.000

(при необходимости использовать фракционную местную анестезию)



Удаление зуба - Иссечение - Разрез
Простая остеотомия - Резекция верхушек корней передних зубов
Простая имплантация (1–2)
Препарирование полости (> 2)
Простые стоматологические хирургические процедуры

Продолжительность процедуры до 45 мин.

Артикаин с адреналином 1:200.000



45 Min

Продолжительность процедуры до 20 мин.

Артикаин без адреналина



20 Min

1. Saklad M. Grading of patients for surgical procedures. Anaesthesiology. (Градация пациентов для хирургических процедур. Анестезиология) 1941; 2: 281–84

2. Kämmerer FW. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012; 113: 495–499.

3. Брошюра препарата Ультракаин® Д без адреналина. По состоянию на май 2022 года.

4. ztm. Issue 19, 2015. dental local anaesthesia with articaine - Adjusting adrenaline concentration to individual patient condition and indication. Dr. Frank Halling (Выпуск 19, 2015. стоматологическая местная анестезия артикаином - Регулировка концентрации адреналина в зависимости от состояния пациента и показаний. Доктор Фрэнк Халлинг).

* После тщательной оценки соотношения риска и пользы

Для получения дополнительной информации о нашей продукции посетите сайт www.ultracain.ru

Свяжитесь с нами по адресу info@ultracain.ru

Продукция Ультракаин® распространяется через общенациональную дилерскую сеть, что гарантирует оптимальные поставки в любое время. Действуют общие положения и условия дилера.

Septodont GmbH - Felix-Wankel-Str. 9 - 53859 Niederkassel, Deutschland - Tel.: +49 (0) 228 971 26-0 - Fax: +49 (0) 228 971 26-66

Mat-Nr. USD2022-03

Ультракаин®

Местные анестетики серии «Ультракаин» предлагают индивидуальное решение для каждого вида лечения благодаря широкому спектру форм и дозировок, охватывающих все ваши процедуры и соответствующих всем потребностям ваших пациентов.

Вместе мы продолжаем писать историю

Ультракаин® - потому что каждый пациент особенный



ASA 1-3*
для рутинных
манипуляций¹

45
Min

Ультракаин® Д-С 1:200.000

Преимущества субстанции и терапии
Глубокая анестезия (около 45 минут)

Используйте во время рутинных манипуляций
Удаление одного или нескольких зубов
Препарирование кариозных полостей и зубов под коронку

Начало действия
Через 1–3 мин.

Фармакологические свойства
Быстрое выведение из крови
Связывание с белками = 95%
Период полувыведения = 25 мин.
Низкий уровень аллергенности

Дозировка
1 ампула (1,7-2 мл) на каждый зуб.
Дополнительное введение: от 1 до 1,7 мл

Максимальная дозировка
7 мг на 1 кг массы тела
При концентрации 40 мг артикаина/
мл это соответствует объему 12,25 мл
(примерно 7 цилиндрических ампул) для
пациента весом 70 кг.

Лекарственная форма и размеры упаковки

Карпулы
объемом 1,7 мл
Не содержит парабенов
+ Упаковка из 100
цилиндрических ампул

Разбиваемые ампулы
объемом 2 мл
Не содержит парабенов
+ Упаковка из 8 × 12 (96)
разбиваемых ампул

Хранить
в защищенном от света
месте при температуре не
выше 25°C



Ультракаин® Д-С форте 1:100.000

Преимущества субстанции и терапии
Глубокая анестезия для хирургических операций (около 75 минут)

Используйте во время длительных хирургических операций
Обеспечивает выраженную ишемию

Начало действия
Через 1–3 мин.

Фармакологические свойства
Быстрое выведение из крови
Связывание с белками = 95%
Период полувыведения = 25 мин.
Низкий уровень аллергенности

Дозировка
1 ампула (1,7-2 мл) на каждый зуб.
Дополнительное введение: от 1 до 1,7 мл

Максимальная дозировка
7 мг на 1 кг массы тела
При концентрации 40 мг артикаина/
мл это соответствует объему 12,25 мл
(примерно 7 цилиндрических ампул)
для пациента весом 70 кг.

Лекарственная форма и размеры упаковки

Карпулы
объемом 1,7 мл
Не содержит парабенов
+ Упаковка из 100
цилиндрических ампул

Разбиваемые ампулы
объемом 2 мл
Не содержит парабенов
+ Упаковка из 8 × 12 (96)
разбиваемых ампул

Хранить
в защищенном от света
месте при температуре не
выше 25°C



75
Min

ASA 1-2* для
более длительных
хирургических
операций¹

Ультракаин® Д-С. Ультракаин® Д-С форте. Ультракаин® Д без адреналина.
Активное вещество: артикаина гидрохлорид, адреналина гидрохлорид.
Состав: Д-С и У. Д-С форте: 1 мл раствора для инъекций содержит: активное вещество 40 мг артикаина гидрохлорид, 6/12 µg эпинефрина гидрохлорид. Вспомогательные вещества: NaCl, вода для инъекций или Ультракаин Д. Без адреналина: гидроксид натрия, соляная кислота 10% для корректировки pH. Д-С/Д-С форте дополнительно: метабисульфит натрия. Д-С ампл. 1,7 мл добав.: NaOH, соляная кислота 10% для корректировки pH. Добав.: Метил-4-гидроксibenзоат, NaOH, соляная кислота 10% для корректировки pH.
Применение: Д — без инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии. Особенно подходит для коротких процедур у пациентов с определенными заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми заболеваниями или аллергией на вспомогательный сульфит) и для введения небольших объемов адреналина (использование в передней области, в области нёба). Д-С: местная анестезия для рутинных стоматологических манипуляций. Д-С форте: местная анестезия для хирургического лечения слизистой оболочки и костей, хирургического лечения пульпы, остеотомии, длительной хирургии, чрескожного остеосинтеза, цистэктомии, разреза слизистой оболочки десны и резекции корневого канала.
Противопоказания: повышенная чувствительность к артикаину или к другим местноанестезирующим средствам амидного типа или другим вспомогательным компонентам препарата. Ультракаин без адреналина не подходит для длительных или обширных стоматологических операций. Тяжелые нарушения функции синусового узла или тяжелые нарушения проводимости, острая декомпенсированная сердечная недостаточность, резко выраженная артериальная гипотензия. Дополнительно для У. Д-С и У. Д-С форте: аллергия

или повышенная чувствительность к сульфитам. Относящиеся к эпинефрину: закрытоугольная глаукома, гиперплазия СД, пароксизмальная тахикардия, тяжелая артериальная гипертензия, инфаркт миокарда в течение последних 3-6 месяцев, шунтирование коронарных артерий в течение последних 3 месяцев, одновременный прием некардиоселективных бета-блокаторов, феохромоцитомы, тяжелая гипертония, одновременный прием трициклических антидепрессантов или ингибиторов МАО (не более 14 дней после окончания лечения МАО), анестезия в области сосудистого русла. Внутривенные/внутрисосудистые инъекции противопоказаны. Дополнительно для многодозовых препаратов: аллергия на парабены.
Предупреждения и меры предосторожности: длительное/усиленное действие возможно у пациентов с дефицитом холинэстеразы. Содержит натрий (<1 ммоль/23 мг). Особые меры предосторожности при нарушениях свертываемости крови, тяжелой почечной или печеночной дисфункции, сопутствующем лечении галогенизированными ингаляционными анестетиками, эпилепсии в анамнезе, сердечно-сосудистых заболеваниях, стенокардии, артериосклерозе, стимуляции глубоких структур головного мозга, инсульте в анамнезе, хроническом бронхите, эмфиземе легких, сахарном диабете, тяжелом тревожном расстройстве. Дозировка должна быть минимальной. Аспирируйте инъекцию осторожно в двух плоскостях, чтобы избежать внутрисосудистых инъекций. Принимать пищу можно лишь после прекращения действия местной анестезии. Проконсультируйте лицо, осуществляющее уход, о риске повреждения мягких тканей в результате укусов! Дополнительное влияние на сердечно-сосудистую систему и ЦНС при сочетании различных местных анестетиков. Способность реагировать!

Применение при беременности и кормлении грудью: только после тщательной оценки риска/выгоды. Если требуется, отдайте предпочтение Д-С перед Д-С форте.

Побочное действие. Со стороны иммунной системы: реакции непереносимости (отек/воспаление места введения, покраснение, зуд, конъюнктивит, ринит, отек лица, ангионевротический отек, отек гортани с глобусом и дисфагией, крапивница, нарушение дыхания вплоть до анафилактического шока). Со стороны ЦНС: дозозависимое нарушение ЦНС с беспокойством, нервозностью. Беспокойство, нервозность, головокружение, кома, нарушение дыхания (вплоть до остановки дыхания), тремор и мышечные подергивания (вплоть до генерализованных судорог), головокружение, парестезия, гипестезия, преходящие нарушения зрения, дополнительно для Д-С и Д-С форте: головная боль. Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение АД, брадикардия, сердечная недостаточность, шок (возможно, угрожающий жизни), очень редко тахикардия, нарушение сердечного ритма, повышение АД. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. Дополнительно для Д-С и Д-С форте: Общие симптомы: очень редко: при случайном внутрисосудистом введении возможно появление зон ишемии в месте введения, вплоть до некроза тканей. Очень редкие реакции гиперчувствительности с рвотой, диареей и хрипами. Острые приступы астмы, потеря сознания, шок. Повышенная чувствительность к метил-4-гидроксibenзоату (также поздняя реакция), редко — бронхоспазмы.
Назначение.

Ультракаин® Д Рег. № ЛС-001358
Ультракаин® Д-С Рег. № П N015119/01
Ультракаин® Д-С форте Рег. № П N015117/01

Классификация в соответствии с «Физическим статусом по ASA»2 на основании системных заболеваний¹
ASA 1–3: амбулаторное лечение
– ASA 1: здоровые пациенты
– ASA 2: пациенты с легким общим заболеванием, например гипертонией или неинсулинозависимым сахарным диабетом
– ASA 3: пациенты с тяжелыми общими заболеваниями, например, сердечной аритмией или эмфиземой

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:
Новокол Фармасьютикал оф Канада Инк., Канада